



Baytan Trio 180 FS

Nazwa handlowa produktu:	Baytan Trio 180 FS
Nazwa posiadacza zezwolenia:	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:	Bayer Sp. z o.o.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:	Bayer SAS - Republika Francuska
Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):	R-160/2013
Data wydania zezwolenia:	03.12.2013
Termin ważności zezwolenia:	02.12.2023
Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:	02.06.2024
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:	03.06.2025
Rodzaj preparatu:	Fungicyd
Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:	triadimenol - 150 g, fluoksastrobina - 25 g, fluopyram - 5 g
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:	niebezpieczny dla środowiska
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:	R52/53
Pozwolenie na handel równoległy:	Nie

Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania

Uprawa:	jęczmień ozimy
Agrofag:	zgorzel siewek, mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa, pasiastość liści, głownia pyłąca
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie

Uprawa:	pszenica ozima
Agrofag:	zgorzel siewek, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy, septorioza liści
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie

Uprawa:	pszenżyto ozime, żyto
Agrofag:	zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie

Uprawa:	jęczmień jary
Agrofag:	zgorzel siewek, pasiastość liści, plamistość siatkowa, głownia pyląca
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie

Uprawa:	pszenica jara
Agrofag:	zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie

Uprawa:	owies
Agrofag:	zgorzel siewek, głownia pyląca
Dawka:	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
Termin:	
Zastosowanie małoobszarowe:	Nie