

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:** Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.,  
ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, telefon (0-32) 616 44 42, fax: (0-32) 616 24 17, e-mail:  
rozwoj@azot.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia  
ryzyka dla ludzi i środowiska.**


## F U N A B E N P L U S 0 2 W S

**Zawartość substancji aktywnej:**

**tebukonazol** – (związek z grupy konazoli-triazoli) – 2%.

1-4(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

**Zezwolenie MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r.**



Szkodliwy

Możliwe ryzyko szkodliwego działania w łonie matki.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

### **I OPIS DZIAŁANIA**

Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach

przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

## **II ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI**

### **ROŚLINY ROLNICZE**

#### **1. Pszenica ozima, pszenica jara.**

Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

#### **2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.**

Zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

#### **3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.**

Głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

#### **4. Żyto.**

Głownia żdźbłowa, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

#### **5. Owies.**

Głownia pylista, głownia zwarta.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

### **UWAGI:**

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowania pozostałego zapasu ziarna.

### **III OKRES KARENCEJ**

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.

**NIE DOTYCZY.**

### **IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ**

Okres zapobiegający zatruciu.

**Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies - NIE DOTYCZY.**

### **V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA**

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna..

Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

## **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać pyłu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

## **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

### **Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04	Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99	Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83	Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00	Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46	Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r

Nr partii - .....