

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 341/2012d z dnia 12.12.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 76/2011 h.r. z dnia 05.12. 2011r.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Makhteshim - Agan Poland Sp. z o.o., [ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa](#), tel. +48 (22) 395 66 60, fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl


**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

LOTUS 750 EC

Zawartość substancji czynnej:

fenpropidyna (RS)-1-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]piperidyna;
(związek z grupy morfolin) – **750 g w 1 litrze środka.**

Zezwolenie MRiRW nr R- 76/2011 h.r. z dnia 05.12.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 341/2012d z dnia 12.12.2012 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I. OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ZBOŻA OZIME

A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIENŃ OZIMY, ŻYTO

mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

2. ZBOŻA JARE

A) JĘCZMIENŃ JARY, PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Preparat można stosować również w mieszaninie z fungicydem Orius 250 EW:

B) PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Zalecane dawki: Lotus 750 EC – 0,5 l/ha + Orius 250 EW – 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Środek Lotus 750 EC w mieszaninie ze środkiem Orius 250 EW w pszenicy ozimej działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

C) JĘCZMIENŃ JARY

mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia

Zalecane dawki: Lotus 750 EC – 0,5 l/ha + Orius 250 EW – 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

III. OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIENŃ OZIMY, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIENŃ JARY – 35 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

-Unikać zanieczyszczenia oczu.

-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

| | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| Gdańsk | (58) 682 04 04 | Rzeszów | (17) 866-40-25 |
| Kraków | (12) 411 99 99 | Sosnowiec | (32) 266-11-45 |
| Lublin | (81) 740-89-83 | Tarnów | (14) 631 54 09 |
| Łódź | (42) 657-99-00 | Warszawa | (22) 619-66-54 |
| Poznań | (61) 847-69-46 | Wrocław | (71) 343-30-08 |

Okres ważności - 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -